




Behandeling in thuissituatie

Mogelijkheden bij stabiele patiënt in thuissituatie

- Werkzaamheid Hydroxychloroquine niet aangetoond
- Antibiotica alleen geïndiceerd bij vermoeden pneumonie amoxicilline 3dd 500-750mg gedurende 5 dgn
- Werkzaamheid dexamethason in 1^e lijn niet aangetoond in 2^e lijn alleen effectief bij patiënt met extra zuurstof behoefte
- Indien bedlegerig: trombose profylaxe bij DVT/longembolie in VG of actieve maligniteit, nadroparine 9500IE/ml 1dd 0,3ml s.c., enoxaparine 4000 IE 1dd 0,4ml s.c. Verdubbel dosering bij >110kg

Maximaal beleid thuis als insturengen optie is

- **Zuurstof**
Overweeg bij Sat < 90% of AH > 24/min
Streef naar 90% of hoger (COPD > 88%), max 5 l
Bij ervaren dyspnoe ondanks zuurstof, geef laagdrempelig morfine of benzodiazepine
- **Dexamethason**
Overweeg bij zuurstofbehoefte patiënt in overleg met de longarts
- **Tromboseprofylaxe**
Indien geïndiceerd, zie hierboven

Palliatieve patiënt

- Zuurstof is niet zinvol
- Geef morfine en/of benzodiazepine bij dyspnoe en angst
- Overweeg bij refractaire symptomen palliatieve sedatie



kaderhuisartsen spoedzorg (SpoedHAG)
is een organisatie van Kaderhuisartsen

Ghislaine Heesen, Jozanneke Kant en Jan-Arie van Wijngaarden
Deze kaart is gebaseerd op adviezen van NHG en RIVM.

© 2020 SpoedHAG Versie 1.7 | 18-11-2020

COVID 19 samenvattingskaart



Updates van Esculaap zakkaartjes ontvangen?
Word lid van onze nieuwsbrief: [esculaap.nl/update](https://www.esculaap.nl/update)

Alle adviezen zijn voor zover van toepassing voor personen > 12 jaar

PBM

- Hoesten
- Kortademig
- Koorts (zonder focus)
- Keelpijn
- Neusverkouden
- Smaakverlies
- Reukverlies
- In quarantaine in afwachting test
- <10 dagen uit oranje/rood land

Gebruik volledige PBM

- Er is gratis PBM voor mantelzorgers of palliatieve fase. Maak een recept:
- 'PBM-pakket korte termijn' in afwachting van test
 - 'PBM lange termijn' bij bewezen COVID-19

Quarantaine en isolatie

Afkomstig uit oranje/rood land	quarantaine 10 dagen
Nauw contact of huisgenoot met COVID-19	quarantaine 10 dagen Na 1 december 5 dagen en dan test
COVID-19 verdachte klachten	quarantaine tot uitslag test
Huisgenoot met koorts of kortademigheid	quarantaine tot uitslag test
COVID-19 positief zonder klachten	isolatie 3 dagen
COVID-19 met klachten	isolatie ≥ 7 dagen*
COVID-19 pos.cen immuungecompromiteerd	isolatie ≥ 14 dagen*

(*) Besmettingsgevaar geweken indien

- 24 uur klachtenvrij** EN minimaal 7 dagen na 1^e ziekte dag
Maar bij: pneumonie / ziekenhuisopname / immuungecompromiteerd dan
24 uur klachtenvrij EN minimaal 14 dagen na 1^e ziekte dag
(**) zorgverlener: bovendien 48 uur koortsvrij

Zorgmedewerker in afwachting testuitslag

Geen klachtenen continuïteit komt in gevaar
Werken met mondneusmasker en handschoenen

Milde klachten en sneltest negatief
Alleen werken als continuïteit van zorg in gevaar komt
Werken met mondneusmasker en handschoenen

Klachten
Niet werken



Bij deze kaart hoort een instructieimpje

Serologische antilichaamtest
Aantonen doorgevoerde Covid-19
Afname v.a. 2wkn na 1^e ziekte dag, bij voorkeur pas na 3wkn
POCT niet betrouwbaar

PCR
Neus en keel swab
Meest sensitief in eerste 7 dagen
Afnemen v.a. 1^e ziekte dag
Klinische sensitiviteit 70-90%

Antigeen sneltest
Neus en keel swab
Meest sensitief in eerste 7 dagen
Ga bij een positieve test uit van Covid-19
Verrijkt bij negatieve test PCR ter controle
Niet betrouwbaar bij "geen klachten"

Test door GGD
Telefonisch vermoeden COVID-19 of patiënt om andere reden op spreekuur

Test door huisarts
Patiënt op spreekuur COVID-19 verdacht

Testen

Welke test?